

下痢性貝毒ペクテノトキシン 6 の精製と毒性評価

メタデータ	言語: Japanese
	出版者: 水産総合研究センター
	公開日: 2024-06-04
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 鈴木
	メールアドレス:
	所属:
URL	https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2006675

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



下痢性貝毒ペクテノトキシン6の精製と毒性評価

背景と目的

1. 下痢性貝毒ペクテノトキシン6 (PTX 6) は, わが国のホタテガイ (*Patinopecten yessoensis*) の主要毒であり, 有毒プランクトンが生産するペクテノトキシン2 (PTX2) のホタテガイ代謝物です (図1)。これらの毒は, 下痢性貝毒公定法 (マウス腹腔内投与試験) による致死毒性により発見され, 現在は下痢性貝毒として規制の対象となっています。
2. 近年, PTX2 の毒性評価が各国で行われており, 経口投与では PTX2 には下痢原性がないことが明らかになり, 下痢性貝毒の規制対象から除外する方向で国際的な議論が進んでいます。
3. PTX6 の経口毒性については明らかにされていないため, 本研究では PTX6 をホタテガイから大量に精製し, マウスやラットを用いた病理学的毒性試験や吸収試験により, その経口毒性を評価しました。

成 果

1. PTX6 を 6.1mg 精製し, H-NMR や MS スペクトルの解析により, 毒性評価試験に利用できる高純度であることを確認しました。
2. 海洋生物毒としては極端な高濃度といえる 2-7mg/kg b.w. の PTX6 をマウス及びラットに経口投与して毒性の有無を調べましたが, 病理学的な観察では顕著な毒性は確認されず, 経口毒性のリスクは極めて低いことがわかりました。
3. PTX6 は経口投与では下痢原性を示さないことが明らかになりました (図2)。
4. マウスに PTX6 と下痢性貝毒オカダ酸を同時投与して, 下痢原性の発現における PTX6 の相乗作用を調べました。その結果, PTX6 の相乗作用は確認されませんでした。




図1 ペクテノトキシン6




図2 ペクテノトキシン6を経口投与したマウス腸管の重量% (マウス体重比)。下痢原性が見られる場合は, 顕著な腸管重量の増加が見られる。

波及効果

PTX6 は経口毒性のリスクが極めて低く, また, 下痢原性がないことが明らかになり, 国際的な動向に対応し, PTX6 を下痢性貝毒の規制対象外とするための科学的データを得たことにより, 将来の規制改正に向けて基盤を整えることができました。

共同研究機関, 協力機関: 千葉大学真菌医学研究センター

問い合わせ先: 利用加工部 機能評価研究室 (鈴木)